



関節痛のサインチェック項目

以前に比べて…

- 散歩や遊びに行きたがらなくなった
- 階段の上り下りがスムーズではない
- 歩く速度がゆっくりになった
- 動きがぎこちなく、足を引きずっているように見える
- 背中や足を触ると嫌がる
- 甲高く吠えたり、クンクンとすり泣く
- 元気がなく、家族とのコミュニケーションが減った
- 食欲がなくなった

こんな徴候がみられたら…
動物病院にご相談ください

オーナー、愛犬、動物病院、メタカム®が
一緒に取り組むペインコントロール

TEAM Metacam® (チーム メタカム)



進行性の慢性疾患である骨関節炎と上手に付き合い、愛犬のQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を改善していくためには、いろいろな面で総合的な管理が必要となります。

ペーリンガー社では、“TEAM Metacam”と題し、オーナーの皆様方、愛犬、動物病院、メタカム®を1つのチームとして、関節炎にともなう様々なケアをバックアップし、愛情をもって治療に取り組まれるオーナーの皆様方を応援しています。

動物病院の先生におたずねください。

あなたの愛犬の1日の投与量は、

滴です。(初日: 滴)

詳しくは当院にご相談ください。

【製造販売元(輸入発売元)】



ペーリンガーアイゲルハイム ベトメディカ ジャパン株式会社
〒666-0193 兵庫県川西市矢間 3-10-1

【プロモーション提供】



大日本住友製薬株式会社
アニマルサイエンス部
〒553-0001 大阪市福島区海老江1-5-51



META-R-200.06.09作成IZ



How can Everybody Win?



あなたの愛犬は 何か伝えようとしていませんか？

関節炎で苦しんでいるのかもしれません

あなたのかわいい愛犬も、われわれヒトと同じように年齢を重ねるとともに、いろいろな健康上の問題が起こってきます。関節炎もその一つ。症状が表れる場所は、椎間板や肩、肘、ひざ、手や足のつけ根などです。

ワンちゃんも痛みを感じていますが、それを発見するのは難しいものです。ワンちゃんは痛みを隠そうとしてしまいますし、日常的な動作をよく観察していなければ、微妙な違いを感じ取ることはできません。この痛みのサインを見逃し、そのままにしておくと症状が進行し、重篤な病気になってしまうこともあります。

早期発見こそが、 よい治療のファーストステップ！

関節炎は、早期に治療へ取り組むことが、あなたの愛犬の健康的な生活を実現するための成功の道だといえます。裏面のチェック表で該当する項目があるようでしたら、まずは動物病院にご相談ください。

メタカム®の投与方法

使用前に…



使用する前に、必ずボトルをよく振ってください。

小型犬は




食事に滴下して、愛犬に投薬してください。



専用のシリンジをボトルに差し込んでください。

中・大型犬は



シリンジを差し込んだまま、ボトルを逆さまにし、ピストンをゆっくり引いて、愛犬の体重の目盛まで薬を吸い込んでください。



そのまま上下を戻し、シリンジとボトルを逆方向にねじってはずしてください。



食事に滴下して、愛犬に投薬してください。

痛みを和らげるお薬 「メタカム®」とは？

- 世界的に認められている、痛みを和らげるお薬です。
- 1日1回毎日の食事に滴下するだけです。
- 液状タイプですので、体重500g単位で正確・確実に投薬できます。
- ワンちゃんの喜ぶハチミツ風味です。
- 安全ですので、長期間（42日間まで）投薬できます。



犬用非ステロイド系消炎鎮痛剤

メタカム®

1日1回、簡単・確実な投与です

投与方法

「メタカム®」は1日1回、ボトルから体重1kgあたり2滴を食事に滴下して、薬を投与することができます。小型犬の場合は、直接ボトルから適正量を食事に滴下してください。中・大型犬の場合は、左図の手順で、専用のシリンジを用いて食事に滴下してください。

初日の投与量

投与初日は通常の2倍量、つまり体重1kgあたり4滴を食事に滴下してください。シリンジを用いて投与する場合は、愛犬の体重の2倍の目盛（例：10kgの場合は20kgの目盛）まで吸引してから、食事に滴下してください。

※投与する際には、キャップを開ける前に必ずボトルをよく振ってください。

※一度開封した製品は、6ヶ月間使用できます。