

明治製菓から フィラリア予防のお話



フィラリア症の予防については当院スタッフに
お気軽にご相談ください。

明治製菓のパナメクチン[®]チュアブルシリーズ

動物用医薬品 犬糸状虫症予防・消化管内線虫駆除剤 要指示医薬品

パナメクチン[®]チュアブルP

イベルメクチン ビランテルパモ酸塩 含有

●効能・効果 犬糸状虫の寄生予防 犬回虫及び犬鉤虫の駆除

●パナメクチンチュアブルP34
対応体重 5.6kg以下

●パナメクチンチュアブルP68
対応体重 5.7~11.3kg



食べさせやすい
ソフトなチュアブル剤



(写真はパナメクチン
チュアブルP136製剤)




●パナメクチンチュアブルP136
対応体重 11.4~22.6kg

●パナメクチンチュアブルP272
対応体重 22.7~45.3kg

狙っている!!

フィラリアの ライフサイクル




5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

蚊の発生時期



※蚊の発生期間、感染期間は地域によって異なります。

フィラリアは— 予防がいちばん




お腹の虫も同時に駆除

犬フィラリア症とは…

犬糸状虫が心臓や肺動脈に寄生することによって起こる病気です。血液の流れが悪くなることにより、心臓のほか肺、肝臓、腎臓、血管に悪い影響を与えます。

月1回のお薬で…




子犬にとって、お腹の虫は寄生率が高いので一緒に退治しましょう。



犬回虫



- 食欲不振
- 嘔吐
- 下痢
- 発育不良




犬鉤虫




- 下痢
- 血便
- 貧血状態



犬回虫・犬鉤虫はヒトにも感染する寄生虫です



（フィラリア予防は継続が大事です！）



※蚊の発生期間、感染期間は地域によって異なります。

監修：今井 壯一 (日本獣医生命科学大学 獣医寄生虫学教授)