

猫 腎臓用 [FKD]  
(ドライタイプ)



猫 腎臓用 [FKW]  
(ウェットタイプ)



## コンセプト

リン  
腎臓のサポート

フード中のリン含量が制限されていることは、腎不全の進行を遅らせるのに不可欠です。

腎臓と心臓のサポート

スペシフィックの原産国であるデンマークは魚に含まれるEPA、DHAに関する研究の世界的な先進国です。EPAとDHAは、腎不全の進行を遅らせるのに役立つオメガ-3脂肪酸です。心疾患を有する猫では、EPAが浮腫を抑え、高血圧と血小板凝集を軽減します。

蛋白質  
肝臓と腎臓のサポート

猫 腎臓用 [FKD] および [FKW] は高品質の蛋白質を含んでいます。猫の尿pHをアルカリ性に傾かせ、蛋白質含量を減らすことで、腎不全の猫における高窒素血症のリスクを軽減します。肝不全の猫では、高アンモニア血症と肝性脳症の症状を緩和します。高品質の蛋白質により、摂取蛋白質量を減らしても十分な量の必須アミノ酸が犬に供給されます。

ナトリウム  
心臓と腎臓のサポート

うっ血性心不全では、低下した心拍出量によって、ナトリウムと水分の貯留が起こります。ナトリウム量を減らすと、水分貯留の悪循環(高血圧と浮腫)を緩和するのに役立ちます。これは腎臓、肝臓、心臓の疾患を有する猫に不可欠な要素です。

尿路結石の対策

蛋白質含量を制限しているため、シュウ酸塩、シスチンおよび尿酸の尿中濃度が低下します。さらに尿pHがアルカリ性に傾くため、尿中のシュウ酸カルシウム、シスチンおよび尿酸塩結晶の沈殿を防ぎ、尿石症の予防に役立ちます。また、猫 腎臓用 [FKD] および [FKW] にはクエン酸カルシウムが含まれており、シュウ酸カルシウムの結晶の沈殿のリスクが少なくなります。

高度の魚油調製法を用いて製造されたスペシフィック



猫 腎臓用 [FKD]



猫 腎臓用 [FKW]

※合成着色料等を使用していないため、実際の製品の色調とは異なることがあります。

## 賞味期限の見方

### ●ウェットタイプ

未開封で製造後2年、開封後は冷蔵庫で2~3日です。

賞味期限は

アルミトレイの側面あるいは底面に印字されている2段の数字のうち、上段の6桁が賞味期限を表しています。2桁ずつ区切られた数字は右側から順に年(西暦の下2桁)、月、日と読みます。たとえば「06.05.08」であれば2008年5月6日、「10/12/07」であれば2007年12月10日が賞味期限という意味です。

### ●ドライタイプ


賞味期限は

賞味期限は製造後1年6カ月です(袋に記載しています)。上段の6桁が賞味期限を表しています。2桁ずつ区切られた数字は右側から順に年(西暦の下2桁)、月、日と読みます。たとえば「10.06.08」であれば2008年6月10日、「02.11.07」であれば2007年11月2日が賞味期限という意味です。

## 給与する時には

- 新鮮な水がいつでも飲めるようにしておくことが大切です。
- ウェットタイプは、**体温程度に温めて**与えると喜んでよく食べます。
- フードを切り替える場合は、今まで食べていたフードにスペシフィックを混ぜて給与し、少しずつ混ぜる量を増やしていきます。1週間くらいを目安にしてそれ以降はスペシフィックだけを与えるようにしてください。

製造元: VetXX社(デンマーク)

輸入・販売元:  シェリング・ブラウアニマルヘルス株式会社

ホームページアドレス <http://www.spah.jp>

本社: 大阪府大阪市中央区平野町2丁目3-7

連絡先: コンパニオンアニマル事業部

〒163-1033 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーS棟33階

TEL 03-6901-1973 FAX 03-6901-1982

DV-1414

060845(M)

# 猫 腎臓用



# SPECIFIC<sup>®</sup> スペシフィック

## 猫 腎臓用 [FKD/FKW]

適 応 (FKD/FKW)

- ・慢性腎不全
- ・肝不全(胆汁うっ滞を除く)
- ・うっ血性心不全、高脂血症、浮腫
- ・シュウ酸塩、シスチン、尿酸塩尿石症



高度の魚油調製法を用いて製造されたスペシフィック



スペシフィックは  デンマーク製です。






猫 腎臓用 [FKD]  
(ドライタイプ)  
猫 腎臓用 [FKW]  
(ウェットタイプ)



## 腎不全について

腎臓の組織の大部分が壊れて、腎臓が十分に働かなくなった状態を慢性腎不全といいます。腎不全になると、蛋白質を代謝したときにつくられる窒素化合物をうまく排泄できなくなり、血液中の窒素の濃度が上昇する高窒素血症になります。また多くの場合、血液中のカリウムやカルシウム、リンなどの濃度に異常がみられます。腎臓の病気があるとき、腎臓の負担を軽減させるようなフードが理想的です。つまり、リンや蛋白質含量が少なく、EPAやDHA含量の多いフードが愛められます。また、食欲が低下した動物のために、嗜好性が高いことも腎不全時の食事療法食には大切なポイントです。腎臓の組織は一度破壊されると、治療をしてももとは戻りません。そのため、腎不全の猫に対しては、飼主のみなさまが普段からフードや、しっかり水を飲んでいることに注意する必要があります。腎不全の猫の食欲は通常低下するため、高嗜好性の猫 腎臓用 [FKD] や [FKW] は最適です。



猫 腎臓用  
[FKD]



### 1日当たりの給与量(g) (FKD)

	やせすぎ	理想体重	肥満
kg	g	g	g
1	20	15	15
2	35	30	25
3	45	40	30
4	60	50	40
5	70	60	45
6	80	65	55
7	90	75	60
8	100	80	65
9	110	90	70
10	115	95	80
11	125	105	85
12	135	110	90

※ 1日エネルギー要求量は、品種、飼育環境、季節や活動性などにより猫ごとに異なるため、全身状態や体重を継続的にモニタリングし、それに従って給与量を調整することが望まれます。

### 給与が望ましくない動物 (FKD)

- ・子猫、妊娠あるいは授乳中の雌猫。
- ・胆汁うっ滞に罹患している猫(猫 減量用 [FRD/FRW] やプレミアム・メンテナンス成猫用 [FXD] のような脂肪が制限されたフードがより適しています)。
- ・ストルバイト尿石症に罹患している猫。

### 原材料 (FKD)

- ・小麦、トウモロコシ蛋白、動物性油脂(豚および牛)、トウモロコシ、魚油、米、卵類、魚粉、粉末セルロース、ジャガイモ蛋白、ミネラル、バターミルクパウダー、ビタミン、加水分解鶏肉、サジオモダカ種子(繊維)、タウリン、ヒマワリ油、L-カルニチン。
- 酸化防止剤：BHT、L-アスコルビン酸パルミン酸エステル、没食子酸プロピル
- 乳化剤：クエン酸モノグリセリド
- ・合成着色料、合成フレーバー、遺伝子組換え作物は含みません。



猫 腎臓用  
[FKW]



### 1日当たりの給与量(g) (FKW)

	やせすぎ	理想体重	肥満
kg	g	g	g
1	55	45	40
2	95	80	65
3	130	110	85
4	160	135	105
5	190	160	125
6	220	180	145
7	245	205	165
8	270	225	180
9	295	245	195
10	320	265	215
11	345	285	230
12	365	305	245

※ 1日エネルギー要求量は、品種、飼育環境、季節や活動性などにより猫ごとに異なるため、全身状態や体重を継続的にモニタリングし、それに従って給与量を調整することが望まれます。

### 給与が望ましくない動物 (FKW)

- ・子猫、妊娠あるいは授乳中の雌猫。
- ・胆汁うっ滞に罹患している猫(猫 減量用 [FRD/FRW] やプレミアム・メンテナンス成猫用 [FXD] のような脂肪が制限されたフードがより適しています)。
- ・ストルバイト尿石症に罹患している猫。

### 原材料 (FKW)

- ・豚肉類、魚類、ダイズ油、トウモロコシ、魚油、卵類、粉末セルロース、ミネラル、ビタミン、サジオモダカ種子(繊維)、タウリン、L-カルニチン。
- ・酸化防止剤、合成着色料、合成フレーバー、遺伝子組換え作物は含みません。