

## スペシフィック® 猫用療法食ラインナップ



### スペシフィック®の賞味期限

スペシフィック ドライ全製品の賞味期限は製造後18ヶ月です。賞味期限はパッケージに記載されています。スペシフィックのドライフードは開封後3ヶ月以内に使用してください。また、魚油含量の高いドライフードでは、窒素充填した上で気密性の高いパッケージを使用しています。スペシフィック ウェット全製品の賞味期限は製造後24ヶ月です。賞味期限は容器(アルミ)の側面または底面に記載されています。\*ドライ、ウェットともに賞味期限の表記は、欧州式となります。(以下の通り)

賞味期限記載例 03.08.2011 ⇒ 2011年8月3日(「03.08.11」と記載されることもあります)  
18.12.2012 ⇒ 2012年12月18日(「18.12.12」と記載されることもあります)

詳しくはスペシフィック® オフィシャルサイト



[www.specifical.co.jp](http://www.specifical.co.jp)

または、スペシフィックライン(お客様相談室)へ。

☎ 0120-120-613 ※携帯電話からも無料です。

輸入・販売元 **株式会社インターベツト**

〒102-8667

東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア 8F

[www.specifical.co.jp](http://www.specifical.co.jp)

スペシフィックは、デンマーク生まれの  
安全で安心なフードです。



## 信頼のDechra Veterinary Products A/S社製

デンマーク・Dechra Veterinary Products A/S社は、  
1975年から犬および猫用の食事療法食の開発に着手。

獣医師との協力のもと、

愛犬・愛猫の生活の質を改善すべく

研究と開発、品質向上に努力し、

スペシフィックを供給し続けてきた

アニマルヘルスのリーディングカンパニーです。

## 農・畜・水産の王国、 デンマーク生まれ。

世界屈指の農産物輸出国で畜・水産も盛んなデンマークは、自然に恵まれたエコの国としても有名です。

食の安全性と品質に対する意識が高いデンマーク生まれのスペシフィックは、愛犬・愛猫の健康をサポートする高品質フードとして、ヨーロッパを中心に多くの獣医師や飼主選ばれています。



## 高レベルの安全性・ 栄養基準を満たしています。

スペシフィックは、ヨーロッパにおけるペットフードの添加物・材料の検査方法や安全基準の品質向上を管理している「FEDIAF (欧州ペットフード産業連盟)」による安全性・栄養基準を満たしています。

FEDIAF 欧州ペットフード産業連盟が定めた安全性・栄養基準

## 安全性が高く、 安心して与えられます。

合成着色料、合成フレーバーをせず、酸化防止剤もウェットフードでは一切不使用。ドライフードでは品質を保つために最小限の酸化防止剤BHTとBHAを使用しています。また、オメガ-3脂肪酸を特に高濃度で配合しているフード※1では、BHTやBHAの他に2種の酸化防止剤※2と1種の乳化剤※3を使用。  
すべて人の食品への使用も認められている成分です。

※1:FSD、FOD、FRD、FKD

※2:L-アスコルビン酸、α-トコフェロール、没食子酸プロピル

※3:クエン酸モノグリセリド



スペシフィックは、原材料にこだわった  
自然派ヘルスフードです。



#### オメガ-3脂肪酸の有益な作用

皮膚や被毛の機能の維持

免疫機能の維持

子犬・子猫における脳や視覚の発達

腎機能の維持

関節可動性の維持



## 原材料へのこだわりは、 おいさと健康のため。

ニシンをはじめ、肉類も鮮度を重視してデンマーク産を中心に厳選し、冷凍肉類は極力使用していません。穀類や野菜も食の安全性と品質に対する意識が高いデンマーク基準で選んだものばかり。添加物を最小限に抑え、フードの色にばらつきがあるのも合成着色料に頼らない自然派の証拠です。

## 天然素材フレーバーの やさしいおいしさ。

愛犬・愛猫にとってのおいしさとは何かを長年にわたり研究し、味、におい、噛みごたえ、舌ざわりなどを総合的に検査し、テストを繰り返しています。着色料は一切使用せず、おいさを大きく左右するにおいについても、鶏肉や魚などから抽出した天然素材フレーバーだけを使用しています。



## 健康サポート成分、 オメガ-3脂肪酸がたっぷり。

左の魚マークがついたスペシフィックは、重要な不飽和脂肪酸であるEPA\*とDHA\*を含んでいます。どちらも魚油に豊富に含まれるオメガ-3脂肪酸で、調理法や保存法を誤ると効果が減少してしまいます。スペシフィックには、魚油加工の特殊技術によりオメガ-3脂肪酸が高品質のまま含まれています。

\*EPA=エイコサペンタエン酸、DHA=ドコサヘキサエン酸。  
いずれも魚油に豊富に含まれるオメガ-3脂肪酸。

スペシフィック®

# 猫用療法食 ラインナップ

病気になった愛猫の健康をサポートするための  
<食事療法食シリーズ>は、おいしさと栄養で、  
愛猫の健康と幸福を応援します。

スペシフィック®

## FSD /FSW

### 低pH スターター

ストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿の産生を助ける食事療法食で、ストルバイト尿石症の猫に配慮しています。また、飲水量(尿量)を増加させるために、ナトリウムを軽度を増強しています。

#### 特徴

● [FSD/FSW]は以下のようにストルバイト尿石症の猫に配慮しています。●ストルバイト(結石・結晶)の成分であるマグネシウムとリンの含量を制限しています。●ミネラルを中心とする原材料の配合調節により、ストルバイトが結晶化しにくい低pH尿(6.0-6.3)の産生を助けます。●ナトリウムを軽度~中等度に増量しているため、飲水量増加に伴う尿量の増加により、尿中のストルバイトの成分が希釈されます(給食期間:通常1~2ヵ月)。

スペシフィック®

## FCD /FCW

### 低pH メンテナンス

ストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿の産生を助けることにより、ストルバイト尿石症の猫に配慮した食事療法食です。

#### 特徴

● [FCD/FCW]は以下のようにストルバイト尿石症の猫に配慮しています。[ストルバイトの成分であるマグネシウムとリンの含量を制限しています。ミネラルを中心とする原材料の配合調整により、ストルバイトが結晶化しにくい低pH尿(6.0-6.3)の産生を助けます。]●原材料の見直して得られたシュウ酸カルシウムに対する低いPSS値により、シュウ酸カルシウム尿石症のリスクが低くなっています。●低ナトリウム+低リン処方により、長期使用時の健康な腎臓にも配慮しています。●オメガ脂肪酸(EPA+DHA)が含有されているため健康な皮膚・被毛の維持だけでなく、特発性膀胱炎にも配慮されています。

スペシフィック®

## FRD /FRW

### ウェイト・マネージメント

エネルギー量(カロリー)を制限した食事療法食で、減量が必要な肥満あるいは太り過ぎの猫や糖尿病の猫に配慮しています。

#### 特徴

●低脂肪と高繊維を特徴とする低カロリーフードで、肥満や太り過ぎの猫に配慮しています。●蛋白質含量が高く、減量中の筋肉量の維持に配慮しています。●脂肪含量が低く、胆汁うっ滞や高脂血症の猫に配慮しています。●EPA(エイコサペンタエン酸)が含まれ、健康な皮膚と被毛に配慮しています。●低脂肪・高繊維の低カロリーフードである[FRD/FRW]は、糖尿病の猫にも配慮しています。●[FRD]ではストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿(6.0-6.4)の産生を助けることで、ストルバイト尿石症の猫にも配慮しています。

スペシフィック®

## FDW

### リミテッド・プロテイン

原材料の蛋白質源を制限することにより、食物アレルギーの猫に配慮した食事療法食です。

#### 特徴

●原材料の蛋白質源を米と羊肉に制限し、食物アレルギーの猫に配慮しています。●米、羊肉など消化性の高い原材料を用い、下痢、嘔吐などの消化器症状を示す猫に配慮しています。

スペシフィック®

## FKD /FKW

### 低Na-リン・プロテイン

ナトリウム、リン、蛋白質を制限することにより、腎不全や肝不全、心不全の猫に配慮した食事療法食です。

#### 特徴

●リン、ナトリウム、蛋白質を制限し、慢性腎不全の猫に配慮しています。●ナトリウム含量を制限することで、うつ血性心不全の猫に配慮しています。●蛋白質を制限しており、肝不全の猫に配慮しています(胆汁うっ滞を除く)。●シュウ酸カルシウム、尿酸アンモニウム、シスチン尿石の成分の元となる蛋白質を制限しており、シュウ酸カルシウム、尿酸アンモニウムやシスチン尿石症の猫に配慮しています。

## プレミアム・メンテナンス



スペシフィック®  
**FPW** 子猫用 (高栄養)



### 特徴

● FEDIAF (欧州ペットフード産業連盟) が定める成長期の猫の栄養要求量を満たす健康な成長期の猫に適したフードです。



スペシフィック®  
**FXW** 成猫用



### 特徴

● FEDIAF (欧州ペットフード産業連盟) が定める成猫の栄養要求量を満たす、健康な成猫に適したフードです。● エネルギー量を中等度に制限し、炭水化物含量を制限することで糖尿病の猫に配慮しています。● ウェットフードであるため尿量が增量することで、特発性膀胱炎の猫に配慮しています。



## 猫用スペシフィックの主な原材料一覧

	FSD	FSW	FCD	FCW	FDW	FKD	FKW	FRD	FRW	FPW	FXW
米	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
小麦	●		●			●		●			
トウモロコシ		●	●	●		●	●		●		
えん麦								●			
豚肉		●		●			●		●	●	●
鶏肉										●	
鶏肉蛋白加水分解物								●			
羊肉					●						
牛肉		●		●						●	●
蛋白加水分解物 (鶏および七面鳥)	●		●			●					
卵	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
魚類		●					●		●	●	●
魚粉	●		●			●		●			
トウモロコシ蛋白	●		●			●		●			
ジャガイモ蛋白	●		●			●		●			
バターミルクパウダー			●								
ホエイパウダー				●							
酵母		●									
動物性油脂 (豚および牛)	●		●			●		●			
魚油						●	●			●	
ヒマワリ油	●		●			●					
ダイズ油		●		●	●		●			●	
トウモロコシでんぷん	●										
砂糖			●								
サイリウム種皮		●	●	●	●	●	●		●	●	●
粉末セルロース	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
メチオニン	●		●	●	●		●	●		●	●
L-カルニチン						●	●	●	●		
タウリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※原材料の詳細については製品包装上の記載を参考にしてください。

# 猫用スペシフィックの1日あたりの給与量 (g)

ドライタイプ	製品名・特長	低pH スターター			低pH メンテナンス		
		スペシフィック® FSD			スペシフィック® FCD		
		やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ	やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ
0.5 kg		12	10	8	12	10	8
1 kg		20	17	14	21	17	14
1.5 kg		27	23	18	28	24	19
2 kg		34	28	23	35	29	23
2.5 kg		40	34	27	41	35	28
3 kg		46	38	31	48	40	32
3.5 kg		52	43	35	53	44	36
4 kg		57	48	38	59	49	39
4.5 kg		63	52	42	64	54	43
5 kg		68	56	45	70	58	46
6 kg		78	65	52	80	67	53
7 kg		87	73	58	90	75	60
8 kg		96	80	64	99	83	66
9 kg		105	88	70	108	90	72
10 kg		114	95	76	117	98	78
12 kg		131	109	87	134	112	90
14 kg		147	122	98	151	126	101
16 kg		162	135	108	167	139	111
18 kg		177	148	118	182	152	121

ウェイト・マネージメント			低Na-リン-プロテイン		
スペシフィック® FRD			スペシフィック® FKD		
【減量】 肥満	【体重維持】 太りぎみ	【体重維持】 理想体重	やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ
10	12	15	12	10	8
16	20	25	21	17	14
22	27	34	28	23	19
27	34	42	35	29	23
33	40	50	41	34	28
37	46	57	47	39	32
42	51	64	53	44	35
46	57	71	59	49	39
51	62	78	64	53	43
55	67	84	69	58	46
63	77	96	80	66	53
70	87	108	89	74	60
78	96	120	99	82	66
85	105	131	108	90	72
92	113	141	117	97	78
105	130	162	134	112	89
118	146	182	150	125	100
131	161	201	166	138	111
143	176	220	181	151	121

ウェットタイプ	製品名・特長	低pH スターター			低pH メンテナンス			ウェイト・マネージメント		
		スペシフィック® FSW			スペシフィック® FCW			スペシフィック® FRW		
		やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ	やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ	【減量】 肥満	【体重維持】 太りぎみ	【体重維持】 理想体重
0.5 kg		42	35	28	40	33	26	41	51	63
1 kg		71	59	48	66	55	44	69	85	107
1.5 kg		97	81	64	90	75	60	94	116	145
2 kg		120	100	80	112	93	75	117	143	179
2.5 kg		142	118	95	132	110	88	138	170	212
3 kg		163	135	108	151	126	101	158	194	243
4 kg		202	168	134	188	157	125	196	241	302
5 kg		238	199	159	222	185	148	232	285	357
6 kg		273	228	182	255	212	170	266	327	409
7 kg		307	256	205	286	238	191	298	367	459
8 kg		339	283	226	316	263	211	330	406	507
9 kg		371	309	247	345	288	230	360	443	554

リミテッド・プロテイン			低Na-リン-プロテイン			プレミアム・メンテナンス				プレミアム・メンテナンス		
スペシフィック® FDW			スペシフィック® FKW			スペシフィック® FPW				スペシフィック® FXW		
やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ	やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ	-12週	12- 20週	20- 30週	成猫	やせ ぎみ	理想 体重	太り ぎみ
40	33	27	34	28	23	71	57	43	28	57	47	38
67	56	45	57	47	38	119	95	72	48	95	79	63
91	76	61	77	64	51	162	129	97	65	129	107	86
113	94	75	96	80	64	201	160	120	80	160	133	107
133	111	89	113	94	75	237	190	142	95	189	158	126
153	127	102	130	108	86	272	218	163	109	217	181	145
190	158	127	161	134	107	337	270	202	135	269	224	179
224	187	150	190	158	127	399	319	239	160	318	265	212
257	214	172	218	182	145	457	366	274	183	365	304	243
289	241	193	245	204	163	513	411	308	205	410	341	273
319	266	213	271	225	180	567	454	340	227	453	377	302
349	291	233	296	246	197	620	496	372	248	495	412	330

※1日エネルギー要求量は、品種、飼育環境、季節や活動性などにより猫ごとに異なるため、全身状態や体重を継続的にモニタリングし、それに従って給与量を調整することが望まれます。  
 ※減量期間中は【FRD/FRW】推奨量の65%にあたる量を給与することが望まれます。それでも猫の体重が減少しない場合、肥満猫においては肝リピドシスを避けるために、絶食あるいはあまりに急激な減量はすべきではありません。  
 ※授乳期間中では、エネルギー要求量は子猫の頭数で異なります。子猫が2頭、4頭あるいは8頭の場合、必要となるエネルギー量は、成猫の必要量のそれぞれ1.5倍、2倍あるいは3倍となります。

※1日給与量をさらに減らすことを検討する必要があります。

ルギージ量は、成猫の必要量のそれぞれ1.5倍、2倍あるいは3倍となります。