

**! 重要**

**1** ワクチンに過敏な犬の中には、ごくまれにアレルギー反応やアナフィラキシー（けいれん がんめんしゅちょう 痙攣、顔面腫脹、等）が起こることがあります。

このような反応は、接種後30分位までにみられることが多いので、よく犬の状態を観察し、何か異常があればすぐに当院へご連絡ください。

**2** 接種後、まれに注射部位に痛みを感じたり、食欲や元気がなくなったり、軽い発熱がみられることがあります。普段と違う様子がみられたら、すぐに当院へご連絡ください。

**3** ワクチン接種の当日は安静にして、2~3日の間は、激しい運動や入浴、シャンプーはひかえてください。

**4** ワクチン接種後は、免疫ができるまで一定期間※かかりますので、その間は病気を持っている可能性のある動物には近づけないようにしてください。特に、犬が多く集まるような場所（公園、等）は避けましょう。

※詳しくは、獣医師におたずねください。



何かおかしいと感じた場合は、  
すぐに当院へご連絡ください。

ワクチンプログラム

おなまえ ちゃん

初 回 年 月 日

第 2 回 年 月 日

第 3 回 年 月 日

2年目以降 月 日頃

ワクチン接種で作られた免疫を持続させるために、  
毎年1回の追加接種を受けましょう。

+ 連絡先

ビルバックの犬用ワクチン		動物用医薬品	要指示
犬用混合生ワクチン			
犬用ビルバゲン® DA2Parvo	犬用ビルバゲン® DA2PPi/L		

製造販売業者 株式会社ビルバックジャパン（輸入販売元）  
大阪市中央区淡路町1-3-14

Your partner in Animal Health



正しいワクチンプログラム

「これで安心。」

お散歩に行こう!



犬の感染症はたくさんあり、その症状もさまざまです。  
感染症の中には、死に至る、大変恐しい病気もあります。

感染症から愛犬を守るためには、  
「ワクチン接種による予防」  
が効果的です。



## 今日、接種したワクチンが有効な感染症

### 犬ジステンパー

病原体【犬ジステンパーウイルス】

子犬や高齢犬で多く発病します。高熱、目ヤニ、鼻水、クシャミ、元気消失、食欲不振、嘔吐、下痢、震えや痙攣、等の神経症状があらわれます。死亡率が高く、完治してもマヒ、等の後遺症が残ることもあります。

### 犬伝染性肝炎

病原体【犬アデノウイルス1型】

激しい下痢、嘔吐、高熱、元気消失、食欲不振、目の白濁があらわれます。ほとんどの場合において、突然、死に至ります。

### 犬アデノウイルス感染症

病原体【犬アデノウイルス2型】

乾いた咳、鼻水が出て、子犬や高齢犬では肺炎を起こすケースが多々あります。他のウイルスや細菌との混合感染にて重症化する場合があります。

### 犬パルボウイルス感染症

病原体【犬パルボウイルス】

血の混ざった激しい下痢、嘔吐がみられます。伝染能力が非常に強く、死亡率の高い、大変恐ろしい病気です。

### 犬パラインフルエンザ

病原体【犬パラインフルエンザウイルス】

咳、鼻水、軽い発熱が症状としてあらわれます。他のウイルスや細菌との混合感染にて重症化する場合があります。

### レプトスピラ症

病原体【レプトスピラ カニコラ】(細菌)  
病原体【レプトスピラ イクテロヘモラジ】(細菌)

発熱、元気消失、食欲不振、震え、嘔吐、黄疸が出て、腎炎、尿毒症を併発します。犬の尿中に排泄された細菌によって感染が拡大し、人にも感染するため、注意が必要です。

## 犬の代表的な伝染性疾患とその危険性\*

	 致死率	 伝播	 子犬への感染	 2次 二次感染	 人獣共通感染
犬ジステンパー	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 なし
犬伝染性肝炎	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★	 なし
犬アデノウイルス感染症	 ★★★★	 ★★★★	 ★★★★	 ★★★★★★	 なし
犬パルボウイルス感染症	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 なし
犬パラインフルエンザ	 ★★★★	 ★★★★	 ★★★★	 ★★★★★★	 なし
レプトスピラ症	 ★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★	 ★★★★★★

\*各疾患についての危険性は、あくまでも目安であり、地域や状況、個体差、等により多少異なります。詳しくは、獣医師におたずねください。



**危険性**

★★★★★★ 高い

↑ 危険性 ↓

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

なし 低い